

## Maturitätsprüfungen 2009 – Mathematik schriftlich

### Klasse 4B

- 
- Bemerkungen: Die Prüfungsdauer beträgt 4 Stunden.  
Beginnen Sie jede Aufgabe mit einem neuen Blatt!
- Hilfsmittel: Die von Ihren Lehrpersonen bewilligten Taschenrechner und Formelsammlungen.  
Der Rechner muss im Auslieferungszustand sein.  
Sie dürfen Ihr Taschenrechnerhandbuch benutzen (keine Notizen darin!).

Punkteverteilung:

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Total |
|----|----|----|----|----|-------|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60    |

---

### Aufgabe 1

Wir stellen uns eine ägyptische Pyramide, wie die berühmte Cheops-Pyramide vor (siehe Bild). Die folgenden Massangaben sind gegenüber dem Original leicht verändert, damit die Rechnung schönere Zahlen ergibt.

Die betrachtete Pyramide sei eine gerade Pyramide mit einer quadratischen Grundfläche von 230 m Kantenlänge. Für den Neigungswinkel  $\alpha$  der Seitenflächen gegenüber der Grundfläche gelte  $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ . Die Grundfläche mit den Ecken  $ABCD$  der Pyramide liege in der  $x$ - $y$ -Ebene eines dreidimensionalen kartesischen Koordinatensystems, so dass  $A$  im Ursprung liegt,  $B$  auf der  $x$ -Achse und  $D$  auf der  $y$ -Achse. Die Spitze der Pyramide nennen wir  $S$ .



- Bestimmen Sie die Koordinatengleichung der Seitenflächenebene  $E_{ABS}$ , sowie die Koordinaten der Spitze  $S$  der Pyramide. (2 P.)
- Zeichnen Sie ein Schrägbild der Pyramide im Koordinatensystem, das auf dem Beilageblatt gegeben ist. (1 P.)
- Berechnen Sie den Neigungswinkel einer Seitenkante der Pyramide gegen die Grundfläche, sowie den Winkel zwischen zwei benachbarten Seitenflächen der Pyramide. (3 P.)
- Das Zentrum einer würfelförmigen Grabkammer liegt 30 m über der Grundflächenebene, hat von der Ebene  $E_{ABS}$  einen Abstand von 50 m und von der Kante  $AS$  einen Abstand von 50 m. Berechnen Sie die Koordinaten dieses Zentrums. (3 P.)
- Das Zentrum der eigentlichen Königskammer ist der Mittelpunkt der Inkugel der Pyramide. Berechnen Sie die Koordinaten dieses Mittelpunktes und geben Sie die Gleichung der Inkugel an. (3 P.)

## Aufgabe 2

Durch die Gleichung  $y = 30a \cdot \frac{x-a}{x^2}$ , in welcher der Parameter  $a$  nur positive Werte annehmen soll, ist eine Kurvenschar gegeben.

- Zeichnen Sie die Kurve für  $a = 2$  (Einheit auf den Koordinatenachsen: 1 Häuschen). (2 P.)
- Nennen und begründen Sie drei der Eigenschaften, die alle Kurven der Schar haben. (2 P.)
- Auf welcher Kurve liegen die Extremal- und auf welcher Kurve liegen die Wendepunkte der Kurven der Schar? (3 P.)
- Beweisen Sie, dass sich alle Wendetangenten der Kurven der Schar auf der  $y$ -Achse schneiden. (2 P.)
- Der Parameter  $a$  sei wiederum 2. Wir betrachten gleichschenklige Dreiecke  $ABC$  mit der Basis  $AB$ , wobei für die Ecken  $A, B, C$  gelten soll:  $A$  ist der Punkt  $(2|0)$ ;  $B$  ist ein variabler Punkt  $(u|0)$  mit  $u > 2$ ;  $C$  liegt auf der Kurve.  
Gibt es unter diesen Dreiecken eines mit extremalem Flächeninhalt?  
Welche Werte kann der Flächeninhalt eines solchen Dreiecks annehmen? (3 P.)

## Aufgabe 3

Gegeben sind die Funktionen  $f_k$  mit der Gleichung  $y = \left(1 + \frac{x}{k}\right) \cdot e^{-k \cdot x}$  und  $h$  mit der Gleichung  $y = e^x$ . Es wird  $k > 0$  vorausgesetzt.  $G_k$  bezeichne den Graphen von  $f_k$ , und  $H$  denjenigen von  $h$ .

- Zeichnen Sie  $G_k$  und  $H$  für  $k = 2$  im gleichen Koordinatensystem (Einheit auf den Koordinatenachsen: 2 Häuschen). (2 P.)
- Für welchen Wert von  $k$  schneiden sich  $G_k$  und  $H$  auf der  $y$ -Achse senkrecht? (2 P.)
- Für welche Werte von  $k$  liegt der Extrempunkt von  $G_k$  im ersten Quadranten? (2 P.)
- Für welche Werte von  $k$  berühren sich  $G_k$  und  $H$ ? (2 P.)
- $G_k$  schliesst mit der  $x$ -Achse (ab der Nullstelle nach rechts) eine ins Unendliche reichende Fläche ein.  
Berechnen Sie ihren Inhalt in Abhängigkeit von  $k$  (beachten Sie beim Taschenrechner-einsatz:  $k > 0$  ist vorausgesetzt!). Für welchen Wert von  $k$  wird dieser Flächeninhalt minimal?  
Kann man  $k$  so wählen, dass die  $y$ -Achse diese Fläche halbiert? (4 P.)

## Aufgabe 4

Unsere Mensa bietet 12 Süssigkeiten an, die im Folgenden der Einfachheit halber von 1 bis 12 durchnummeriert sind.

| Nr           | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Preis in Fr. | 0.90 | 1.60 | 1.10 | 1.20 | 2.50 | 1.20 | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 2.10 | 2.50 |

- a) Während einer bestimmten 6-Tage-Woche kaufen Sie jeden Tag genau eine Süssigkeit. Wie viele Möglichkeiten für die Wahl der Süssigkeiten in dieser Woche gibt es, wenn
- a<sub>1</sub>) Sie lauter verschiedene Süssigkeiten kaufen und es darauf ankommt, an welchem Tag Sie welche Süssigkeit kaufen, (1 P.)
  - a<sub>2</sub>) Sie lauter verschiedene Süssigkeiten kaufen und es nicht darauf ankommt, an welchem Tag Sie welche Süssigkeit kaufen, (1 P.)
  - a<sub>3</sub>) Sie beliebige Süssigkeiten kaufen und es darauf ankommt, an welchem Tag Sie welche Süssigkeit kaufen, (1 P.)
  - a<sub>4</sub>) Sie beliebige Süssigkeiten kaufen und es nicht darauf ankommt, an welchem Tag Sie welche Süssigkeit kaufen? (1 P.)
- b) Sie machen nun eine ganze 6-Tage-Woche lang jeden Tag folgenden Versuch: Sie werfen zwei Würfel; die Augensumme ergibt die Nummer der Süssigkeit, die Sie an diesem Tag kaufen. Pro Tag kaufen Sie nur eine Süssigkeit.  
Berechnen Sie den Erwartungswert der Kosten für die Süssigkeiten pro Tag. (2 P.)
- c) Eine der begehrten Süssigkeiten sind die Schaumköpfe, die von einer zerbrechlichen Schicht Schokolade bedeckt sind. Diese Schaumköpfe werden von der Herstellerfirma in Packungen mit jeweils 20 Schaumköpfen verschickt. Die Schokoladenschicht eines Schaumkopfes hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.1 Risse.
- c<sub>1</sub>) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einer Packung mehr als 4 Schaumköpfe Risse haben. (2 P.)
  - c<sub>2</sub>) In einer bestimmten Packung habe es genau 5 Schaumköpfe mit Rissen. Sie kaufen 10 Schaumköpfe daraus. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 davon Risse haben? (2 P.)
  - c<sub>3</sub>) In einer anderen Packung habe es ebenfalls genau 5 Schaumköpfe mit Rissen. Sie möchten gerne genau 3 Schaumköpfe ohne Risse haben. Sie beginnen nun, die Schaumköpfe einzeln zu kaufen. Bei jedem Schaumkopf, den Sie kaufen, prüfen Sie nach, ob er Risse hat, dann kaufen Sie den nächsten Schaumkopf. Das machen Sie, bis Sie die gewünschten 3 Schaumköpfe ohne Risse haben.  
Mit welcher Wahrscheinlichkeit müssen Sie genau 5 Schaumköpfe kaufen? (2 P.)

## Aufgabe 5

Die folgenden Teilaufgaben sind voneinander unabhängig.

- a)  $F$  sei die Fläche unter der Kurve mit der Gleichung  $y = \frac{1}{x}$  über dem Intervall  $[1, \infty)$ .

Begründen Sie, dass es möglich ist,  $F$  durch unendlich viele Parallelen zur  $y$ -Achse in unendlich viele Teilflächen von jeweils gleichem Inhalt  $A$  zu unterteilen.

Geben sie ein Beispiel dafür an; d.h. finden Sie die Gleichungen  $x = x_i$  für die Parallelen für einen selbst gewählten Wert von  $A$ .

Was lässt sich über die Folge  $\langle x_i \rangle$  sagen?

$G$  sei die Fläche unter der Kurve mit der Gleichung  $y = \frac{1}{x^2}$  über dem Intervall  $[1, \infty)$ .

Warum ist es jetzt nicht möglich,  $G$  durch unendlich viele Parallelen zur  $y$ -Achse in unendlich viele Teilflächen von gleichem Inhalt  $A$  zu unterteilen? (6 P.)

- b) Beschreiben Sie das Verfahren *Integration durch Substitution* und führen Sie es am Beispiel einer Exponentialfunktion und einer anderen selbst gewählten Funktion durch. (6 P.)

### Zusatzblatt zu Aufgabe 1

